

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

**NE LES LAISSONS PAS SE
PROPAGER !**



Annemasse Agglo

RENOUÉES DU JAPON

(R. du Japon, R. de Sakhaline, R. de Bohême)

Avant floraison : printemps

La renouée du Japon est l'une des plantes les plus envahissantes en Europe. Elle peut dépasser 3 mètres de hauteur et colonise rapidement les bords de rivières, talus et jardins, appauvrissant la biodiversité locale.

COMMENT ELLE SE PROPAGE ?

Elle se reproduit par graines (floraison juil.-oct.), par ses rhizomes souterrains, et même à partir de tout petit morceau de tige ou de racine - notamment transporté par les cours d'eau.

QUE FAIRE SI VOUS EN TROUVEZ ?

- Peu de pieds : arrachage à la main (méthode la plus efficace).
- Grandes surfaces : coupes/tontes très régulières pour fatiguer la plante ; pâturage possible.
- Planter des espèces concurrentes à croissance rapide adaptées au milieu.
- Le mieux : bâcher avant la reprise des plantations.
- Objectif : empêcher la graine, arracher dès le printemps, surveiller tout l'été.
- Nettoyer les outils après la coupe pour éviter la propagation.

QUE FAIRE DES DÉCHETS DE LA PLANTE ?

Fleurs / fruits / tiges / racines

Mettre impérativement sous sacs plastiques hermétiques avant apport en déchetterie (benne encombrants) pour incinération.
Les feuilles seules peuvent être compostées mais sans tige.



SOLIDAGES (VERGE D'OR)

(S. du Canada, S. géant)

La verge d'or forme des colonies denses aux fleurs jaunes très visibles en fin d'été. Elle colonise les prairies, bords de routes et espaces abandonnés, au détriment des plantes locales.

COMMENT ELLE SE PROPAGE ?

Elle se propage par de très nombreuses graines transportées par le vent (floraison août-sept.) et par ses rhizomes souterrains.

QUE FAIRE SI VOUS EN TROUVEZ ?

- Peu de pieds : arrachage à la main.
- Grandes surfaces : tontes très régulières.
- Planter des espèces concurrentes adaptées.
- Objectif : arracher avant la montée en graine (printemps jusqu'en juillet).
- Bien nettoyer les outils après la coupe.

QUE FAIRE DES DÉCHETS DE LA PLANTE ?

Tiges et feuilles (sans fleurs)	Peuvent être compostées ou déposées en déchetterie (benne déchets verts).
Fleurs / graines / racines	Mettre impérativement sous sacs plastiques hermétiques avant apport en déchetterie (benne encombrants) pour incinération.

Avant floraison : printemps - été



BERCE DU CAUCASE

Avant floraison : juin - juillet

La berce du Caucase est une plante imposante pouvant dépasser 3 mètres. Elle est présente sur les bords de rivières et dans les zones humides. En plus d'être très envahissante, elle présente un danger direct pour la santé humaine.

ATTENTION - La sève de cette plante provoque de graves brûlures cutanées au contact du soleil. Ne jamais toucher sans protection. En cas de contact avec la sève : rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin. Porter des gants épais, vêtements longs et lunettes de protection.

COMMENT ELLE SE PROPAGE ?

Elle produit de très nombreuses graines dispersées par le vent (floraison juin-août). Ses graines peuvent rester dormantes plusieurs années dans le sol.

QUE FAIRE SI VOUS EN TROUVEZ ?

- Peu de pieds : arrachage à la main avec PROTECTIONS OBLIGATOIRES.
- Grandes surfaces : coupes très régulières.
- Planter des espèces concurrentes.
- Objectif : arrachage avant la montée en graine (printemps-juillet).
- Protections corporelles obligatoires (sève = brûlures graves).
- Nettoyer les outils après chaque intervention
- **LE MIEUX : Broyer les déchets avant dépôt en composteur ou en déchetterie (si possible)**

QUE FAIRE DES DÉCHETS DE LA PLANTE ?

Tiges et feuilles (sans fleurs)	Peuvent être compostées ou déposées en déchetterie (benne déchets verts).
Fleurs / graines / racines	Mettre impérativement sous sacs plastiques hermétiques avant apport en déchetterie (benne encombrants).



AMBROISIES

(A. feuilles d'armoise, A. trifide, A. à épis lisses)

Avant floraison : juin - juillet

L'ambroisie est une plante à enjeu sanitaire majeur. Son pollen provoque de fortes réactions allergiques chez de nombreuses personnes, parfois sévères. Elle est présente dans les terrains vagues, champs et bords de routes.

ATTENTION - À partir de la floraison (août), le pollen peut provoquer de fortes allergies (rhinite, asthme). Porter un masque FFP2 lors de toute manipulation. Si vous êtes allergique, ne pas intervenir vous-même.

COMMENT ELLE SE PROPAGE ?

Elle produit des milliers de graines dispersées par le vent (sept.-nov.), pouvant rester dormantes jusqu'à 10 ans dans le sol. Le pollen est libéré de juillet à septembre.

QUE FAIRE SI VOUS EN TROUVEZ ?

- Arracher avant l'apparition des fleurs (avant juin-juillet).
- Peu de pieds : arrachage à la main.
- Grandes surfaces : coupes/tontes régulières avant floraison.
- Nettoyer les outils pour éviter la propagation.

QUE FAIRE DES DÉCHETS DE LA PLANTE ?

Tiges et feuilles (sans fleurs)	Peuvent être compostées ou déposées en déchetterie (benne déchets verts).
Fleurs / graines / racines	Mettre impérativement sous sacs plastiques hermétiques avant apport en déchetterie (benne encombrants) pour incinération.



AILANTES / ROBINIERS SUMAC

Avant floraison : printemps - été

Ces arbres et arbustes à croissance rapide envahissent les milieux naturels, les bords de routes et les constructions. Leurs racines peuvent endommager les murs, canalisations et structures.

ATTENTION - Le latex de l'ailante peut provoquer des réactions allergiques cutanées. Porter des gants et des vêtements longs lors de toute manipulation. Certaines personnes peuvent également être sensibles à son pollen.

COMMENT ELLE SE PROPAGE ?

Propagation par graines (floraison avr.–juil.) et par drageons/rejets.

QUE FAIRE SI VOUS EN TROUVEZ ?

- Jeunes plants : arrachage à la main de préférence.
- Tailles et coupes très régulières pour fatiguer la plante.
- Planter des espèces concurrentes.
- Dessouchage au printemps en retirant un maximum de racines traçantes, avec suivi sur 3 ans.
- Objectif : empêcher la graine (arrachage fin juin–fin août, graines en sept.).
- Nettoyer les outils après la coupe.
- **LE MIEUX** : Broyer les déchets avant dépôt en composteur ou en déchetterie (si possible)

QUE FAIRE DES DÉCHETS DE LA PLANTE ?

Tiges et feuilles (sans fleurs)	Peuvent être compostées ou déposées en déchetterie (benne déchets verts).
Fleurs / graines / racines	Mettre impérativement sous sacs plastiques hermétiques avant apport en déchetterie (benne encombrants) pour incinération.



Ailantes



Robiniers



Sumac de Virginie
(vinaigrier)

ARBRES À PAPILLONS (BUDDLEIA)

Avant floraison : printemps - été

Très populaire dans les jardins pour ses fleurs mauves, le buddleia est une espèce invasive qui colonise les bords de cours d'eau, talus et décombres, au détriment de la végétation locale.

COMMENT ELLE SE PROPAGE ?

Reproduction par graines très nombreuses (floraison juin-oct.) et par bouturage.

QUE FAIRE SI VOUS EN TROUVEZ ?

- Jeunes plants : arrachage à la main.
- Tailles et coupes très régulières.
- Planter des espèces concurrentes.
- Dessouchage au printemps avec suivi des rejets sur 3 ans.
- Objectif : arrachage fin juin–fin août.
- Nettoyer les outils après la coupe.
- **LE MIEUX : Broyer les déchets avant dépôt en composteur ou en déchetterie (si possible)**

QUE FAIRE DES DÉCHETS DE LA PLANTE ?

Fleurs / graines / racines	Mettre impérativement sous sacs plastiques hermétiques avant apport en déchetterie (benne encombrants) pour incinération. Les feuilles seules peuvent être compostées mais sans tige.
----------------------------	--



BALSAMINES DE L' HIMALAYA

Avant floraison : printemps - été

La balsamine de l'Himalaya est une grande plante à fleurs roses colonisant principalement les bords de rivières et zones humides. Elle peut atteindre 2 mètres et forme des colonies très denses.

COMMENT ELLE SE PROPAGE ?

Reproduction par graines (floraison juin) dont la dormance dure 2 à 3 ans. Elle se bouture également facilement par racines et tiges.

QUE FAIRE SI VOUS EN TROUVEZ ?

- Peu de pieds : arrachage à la main.
- Grandes surfaces : coupes très régulières.
- Planter des espèces concurrentes.
- Objectif : arracher avant la montée en graine (printemps–juillet).
- Nettoyer les outils après la coupe.

QUE FAIRE DES DÉCHETS DE LA PLANTE ?

Tiges et feuilles (sans fleurs)	Peuvent être compostées ou déposées en déchetterie (benne déchets verts).
Fleurs / graines / racines	Mettre impérativement sous sacs plastiques hermétiques avant apport en déchetterie (benne encombrants).



RÉCAPITULATIF

ESPÈCE	PÉRIODE CLÉ	COMPOSTEUR OU BENNE DÉCHETS VERTS	EN SAC + BENNE EN- COMBRANTS	DANGER
RENOUÉES DU JAPON	Printemps	Feuilles	Fleurs, fruits, tiges, racines	Non
SOLIDAGES (VERGE D'OR)	Printemps - Été	Feuilles (et tiges sans fleurs)	Fleurs, graines, racines	Non
BERCE DU CAUCASE	Juin - Juillet	Feuilles (et tiges sans fleurs)	Fleurs, graines, racines	OUI
AMBROISIES	Juin - Juillet	Feuilles (et tiges sans fleurs)	Fleurs, graines, racines	OUI
AILANTES / ROBINIERS / SUMAC	Printemps - Été	Feuilles (et tiges sans fleurs)	Fleurs, graines, racines	OUI
ARBRES À PAPILLONS (BUDDLEIA)	Printemps - Été	Feuilles	Fleurs, graines, tiges, racines	Non
BALSAMINES DE L'HIMALAYA	Printemps - Été	Feuilles (et tiges sans fleurs)	Fleurs, graines, racines	Non



COMPOSTEURS GRATUITS

Composteurs de jardin, lombricomposteurs, sites de compostage partagé



4 DÉCHETTERIES GRATUITES

Gaillard, Vétraz-Monthoux, Bonne, Saint-Cergues

POUR PLUS D'INFORMATIONS :

04 50 87 88 88
dechets@annemasse-agglo.fr
annemasse-agglo.fr

